

**IN NONNULLAS
FILAGINIS
EVACISQUE
SPECIES EX
NATURALI...**

Filippo Parlatore



IN NONNULLAS
FILAGINIS EVACISQUE SPECIES

EX NATURALI COMPOSITARUM FAMILIA

OBSERVATIONES

AVTHOR

PROF. PHILIPPO PARLATORE



—

22

1. *Frago germanica* Lin.

F. caule erecto, stipulici, superne ramoso dichotomo, foliis tomentosis, linear-oblongis, acutis, capsula aggregato-globosa auribus sessilibusque, involucris foliatis extimis basi tomentosis, apice membraceo-acuminatis, rectis vel inflexis et subarcuatis, internis acuminatis.

F. germanica L. sp. pl. 1311. Dec. prod. syst. veg. VI. p. 147. — *Flora H. B.* pan. p. 377.

Grapholium germanicum Willd. sp. 3. p. 1634.

Gifala vulgaris Curt. dict. 18. p. 531.

Gifala germanica Less. syst. gen. comp. p. 533.

Impia germanica Bluff. et Ping. fl. germ. 1. p. 342.

Grapholium vulgare majus Chap. H. cash. p. 531.

β virens caule gracili, glomerulis minoribus, foliis virentibus.

γ ericocephala, caule foliis glomeratisque magis tomentosis.

Filago ericocephala Curt. pl. rar. p. 344. tab. 691.

Filago germanica γ laevigata Dec. I. 1.

Grapholium germanicum γ laevigatum Duby bot. gall. 1. p. 269.

Florat Aprilis, Majo.

In arvis sterilibus et in collibus. Var. a legi Siciliae. Var. β Siciliae etiam usque in nemoribus Hebrides prope Castelluzzo. Obtinui var. γ ex Lucania a Cl. Gasparrius et ab ipso A. Gussone.

Planta nostra cum speciminibus germanicis exacte quodest.

2. *Fusco pyramidata* β *spathulata*.

F. caulis basi ramosa, erecta, ascendenti-bus, apice dichotoma; folia linear-cuneata, oblongo-spathulata, obtusa, capsulis aggregatis globosis, involucris foliis extimis basi truncatis, apice scarioso-aristatis, aristis reflexis internodiis sessilibus.

Fil. pyramidata L. sp. pl. 1311.

F. germanica β *spathulata* Presl. delict. prag. p. 33.

Floret Mejo, Junio. — In arvis, in collibus totius Siciliae.

A proculanti, cujus varietatem nemalidis a botanica admissam, certis characteribus, involucrisque praesertim foliis utriusque distinctis.

3. *Fusco Candolleana* Nob.

F. caulis brevibus, prostratis, apice subdichotomis, foliis linearibus oblongis, spatulatisve, cuneo-cuneatis, capsulis globosis confertis approximatis, involucris foliis extimis truncatis, apice scarioso-aristatis, aristis reflexis, internodiis saepe cum mucronulo.

F. congesta Des. prodr. syst. veg. FI. p. 148. non Guss!

In caespitibus prostratis multum Siciliae, a Trepuni, usque locis. Habet etiam a Cl. Gussone in Lacina.

Filago congesta Guss. in litt. ad Des. speciei omnino aliena est, et ad *Filaginem* originem Sibthorpii, nam *Elareu* exiguum Des. referenda, ut ego ipse in Gussonii literis et herbario observavi.

4. *Fusco gallica* L.

F. caule erecto vel ascendente, basi ramosa, apice dichotoma rursus erecto-patentibus foliis linear-cuneatis ascendente-bus linearibus erectis capsulis 3-6 aggregatis sessilibus nemalibusque cuneatis, involucris foliis oblongis.

F. gallica L. sp. pl. 1312. Des. prodr. FI. p. 148.

Gnaphalium gallicum Willd. sp. pl. 3. p. 1295.

Xerostem gallicum Bluff. et Ping. 2. p. 344.

Lagla subulata Carr. det. 27. p. 116.

In campis aridis, in collibus apricis Siciliae frequens.

Floret Aprili, Maio.

Caulis basi ramosus, superae parte ramosus, tomentosus, ramis erecto-patentibus. Folia linearis-subulata, superiora, sive capitulis approximata, erecta. Capitula parva, subtriquetra, vix inaequalia.

5. *Filago tenuifolia* Presl.

F. caule erecto, superae ramoso-dichotomo, ramis divaricatis, foliis angustis linearibus acutis, superioribus bracteantibus recurvis, capitulis 6 in aggregatis sessilibus terminalibusque tomentoso-lanatis, involucri foliolis obtusis.

F. tenuifolia Presl. delc. prag. p. 101.

F. gallica β *tenuifolia* Dec. prodr. 1728. reg. VI. p. 248.

Gnaphalium vulgare foliis hinc angustioribus, oblongis capitulis subsessilibus. Cap. pamph. sic. exempl. Bibl. pub. Paterni 2. t. 237.

Filago umbellata major *tenuifolia*, filo pari Dec. 1. 41.

In campis aridis Siciliae.

Floret Aprili, Maio.

A *F. gallica* facile distinguitur habita, caule inferae simplici, superae vix ramoso, ramis divaricatis, magis tomentosis, foliis angustioribus et minus acutis, superioribus sive capitulis approximatis, recurvis, capitula majoribus numerosioribus vix tomentoso-lanatis.

6. *Filago Capensis* Nob.

F. caule erecto simplici vel ramoso, ramis elongatis, foliis linearibus tomentosis, capitulis sessilibus subulatis terminalibusque subrigatis, sessilibus pedunculatisque, involucri foliolis acutis in fructu sessilibus.

Gnaphalium Capense Carr. in Dec. prodr. VI. p. 249.

Filago struaria γ *Capensis* Dec. 1. c.

*F. urens*is *Varia* H. B. par. p. 378, ex loco.

Grapholium majus rugosiori folio, inter caulem longitudinem stellatum *Cyp. H. cash. p. 86.*

Grapholium majus per caulem longitudinem stellatum *Cyp. pamph. sic. 1. tab. 171.*

Filago major secundum caulem capitalis trigonis per stellam deliscentibus, *Ron. 1. 145.*

In arvis, inter segetes, in collibus et in montosis.

Siciliæ a Milinark, Marina, Ogliastro, Pizzina.

Molania, Castelbuono, Polizzi &c.

Floret Majo, Juxta.

A *Filagine* arvensi habito, ramis elongatis, capitulis subpictis, pedunculisque et calycibus in fructu stellatis omnino distincta.

7. *Fusco Lagopus* Nob.

F. caule erecto subsimplici, foliis mollioribus tomentosis, oblongo-lanceolatis, capsulis subultratis vel parce aggregatis antheribus terminalibusque, involucri tomentosi foliis molli.

Grapholium Lagopus *Syrden. in Philid. sp. pl. 3. p. 1837.*

Grapholium pedunculis & *Ten. incl. rem. H. ncep. 1830 p. 14.*

Filago arvensis β *Lagopus* *Dec. prodr. FI. p. 148.*

F. alpensis *Presl. delis. prag. p. 100.*

Grapholium alpinum minus capitulis conglomeratis in ramis oppositis *Cyp. pamph. sic. p. 30.*

Grapholium alpinum parvam caule, capitulis conglomeratis *Cyp. Pamph. sic. exempl. Bibl. publ. panorm. 2. t. 188. et 1. tab. 50.*

Helichrysum alpinum minus capitulis in ramis oppositis *Dec. 1. 113.*

In paucis sterilibus montosis absteribus.

Molania affe Colina grande.

Species a *Cl. Candolle* cum arvensi confusa; a qua potissime differt caule hamis, simplici, foliisque oblongo-lanceolatis, mollioribus tomentosis, capsulis subultratis et minus aggregatis.

8. *Eras discolor* Dec.

E. caule hamili, basi ramoso, foliis obovato-lanceolatis, floralibus involucri longioribus, capitulis aggregatis axillaribus sessilibusque, involucro (discoloris) foliolis, basi tomentoso-floccatis, interioribus apice obtusis.

Eras discolor Dec. *prodr. syst. nat. F. p. 458.*

Filago discolor Guss. in *lit. ad Dec.*

In sterilibus calcareis Nubodum.

Habui a Cl. Gussone.

Florat Junio, Julio.

A sequenti potissimum differt, caule basi ramoso, foliis oblongo-lanceolatis, floralibus capitulo longioribus, capitulis minus aggregatis haud globosis nec arachnoidis, involucro foliolis discoloribus, interioribus obtusis.

9. *Eras Heldreichii* Nob.

E. hamillima, subcaulis, foliis tomentoso-lanceatis, superioribus linearibus, floralibus obovato-spathulatis involucri brevioribus, capitulis aggregato globosis confertis, arachnoidis, involucro (concoloris) foliolis crenatis acutis, interioribus apice dilatatis truncatis.

In cassis calcareis elatioribus Siciliae.

Madonie a Pietrafacile invenit amicis Tendoris De Heldreich botanicos egregios cultor.

Florat Majo, Junio.

Species omnium minima, et siccis natis arellarum magnitudinis, glomerulum sphaericum arachnoidicum, efformans. Capitula flava, pyramidalia, dense aggregata in glomerulum arachnoidicum. Involucri foliolis exteriora breviora, acuta, interiora numerosiora et longiora, carinata, carina cristatula, apice dilatata, obtuse-truncata, in medio emarginata, vel truncato-lanceola. Semina laevia, subangulata, cinereo-fusca.

10. *Eria exigua* Dec.

E. caule prostrato, ramoso, foliis oblongis, cuneo-ovatis, sessilibus capitulis longioribus, capitulis dense congestis, involucris foliatis externis basi tomentosis, interioribus obtusis.

Filago exigua Sibth. *prodr.* 2. p. 207.

Filago congesta Guss. in litt. ad Dec. ? non Dec.

In arvis Siciliae meridionalis. — *Floret* Majo, Junio.

Capitula dense aggregata globosa, in quaque glomerulo 5 8. Involucris foliis externis breviora, basi tomentosa, cartilaginea, carinis vixillis, reliqua parte flava, apice subulato-eristata, interiora longiora, obtusa. Semina parva, oblonga, fusca.

Datum Pisa die 13 Martii 1841.



(*Extrait del' Annuaire Tuscan di Scienze Mediche, Fisiche, e Naturali*
T. 1. 25^a li. anno 1841.)

